

Avril 2019 EQUILIBRE AGRO-SYLVO-CYNEGETIQUE

Bonjour à tous .

Je suis ML , très impliqué dans notre Syndicat sur le sujet Chasse .

Je fais suite aux informations que vous avez reçu , concernant les prochaines élections à la FDC 14 .

Je vous confirme que par conviction , je me suis porté candidat , compte tenu des modifications de la Loi chasse attendue .Transfert de l'administration des PC aux Fédé.

Je remplacerai Bernard Morel , administrateur sortant , et soutiens la liste de Jean Christophe Aloé tout en faisant valoir les intérêts des forestiers . Il faut que notre nombre compte .

Cette élection n'est pas une simple formalité , car la concurrence est vive , c'est la raison de notre sollicitations pour nous soutenir en allant voter ou en nous confiant votre procuration .

Revenons au sujet :

JF Jacquet m'a demandé de vous exposer le thème de « L'équilibre Agro- Sylvo-Cynégétique » qui est encore empirique faute de protocole scientifique établi .

Tout de Go je lui ai répondu que ce ne devait pas être un sujet brûlant d'actualité , supposant que l'équilibre devait être le fait actuel au vu des très faibles recours et demandes d'appuis des PC puisque pour la prochaine saison seulement 3 demandes nous ont été transmises pour 50 ha sur les 49 000ha boisés du Calvados !

Si en d'autres occasions vous souhaiteriez que vos demandes de PC en accroissement soient défendues par le syndicat il faut nous adresser copie de votre demande de PC au plus tard fin Février en motivant le plus possible vos demandes supplémentaires

Pour traiter le sujet « Equilibre Agro sylvo cynégétique » en plus des diverses littératures je me suis servi de mes expériences : En 30ans d'expériences forestières je n'ai jamais réussi une plantation sans protection des plants contre le gibier , ainsi que vos nombreux témoignages sur les hardes hivernales dans vos propriétés .

Alors que tout devrait être simple la capacité d'accueil du milieu détermine le nombre d'animaux acceptable .

Le grand gibier est devenu un risque au même titre que la tempête ou l'incendie .

Je ne parlerai pas longuement du grave volet agricole , n'ayant ni mandat ni compétence . Je vous indiquerai seulement l'importance que revêt de nos jours le Couvert Hivernal Piège à Nitrates CIPAN sur les habitats du grand gibier : le risque réside dans le maintien des animaux en plaine et son cortège de dégats .

Le Sujet simplifié :

L'équilibre « Forêt- Gibier » et ses conséquences :

Celui qui profite du gibier paye à celui qui en pâtit , doit être notre mot d'ordre .

Les Acteurs : les 3 grands ongulés de plaine .

En l'absence de super prédateur c'est le chasseur qui régule . On estime que les populations basées sur des observations humaines sont sous estimées de X3 .

Le CERF élaphe : Présence très localisée Massif de CERISY et environs , ponctuellement au sud Calvados et Manche , les prélèvements sont d'environ 100 grands cervidés par an sur nos 2 départements . Les dégâts sont Abroutissements , Ecorsages et Frottis .La densité limite maxi admise en milieu riche : 5 cerfs/100 ha.

Le CHEVREUIL : La « Bête noire du forestier » . Présence généralisée Plaine et Forêt . prélèvements + ou – 5000 chevreuils pour chaque département . Dégâts : Abroutissements et Frottis . La densité limite max admise en milieu riche 20 chi/100 ha .

Le SANGLIER : La peste pour l'agriculteur . Habituellement animal de forêt . Présence encore en expansion rapide . Prélèvements + ou – 5000 sangliers par département. Dégâts en forêt sur consommation de glands , et déterrage des jeunes plants en régénération artificielle (substrat riche) c'est un gibier supportable en forêt .

CE SONT DES PRELEVEMENTS IMPORTANTS ..

Le Théâtre : L'acteur principal en sera le Chevreuil .

Gaullis , perchis , Forêt mature : impression d'équilibre , le bourgeon terminal est hors d'atteinte , l'écorce devient plus épaisse et dure . Les dégâts de chevreuils sont banalisés .

Après la seconde éclaircie et jusqu'à la forêt mûre nous devenons attentifs aux régénérations , nous avons l'impression que la densité des chevreuils augmente sérieusement . Les dégâts sont flagrants c'est déjà l'état de déséquilibre .

Après la coupe rase, plantation ou régénération nat . ce sera la Bérésina sur vos chênes et douglas juvéniles sans protections , parce que le milieu va devenir très riche en végétations ligneuse et semi-ligneuse et ce sera le régal des chevreuils . Il existe des exceptions remarquables « Bois Landry » en Eure et Loir les régénérations sont protégées dans les andains de rémanants et des broyages hauts inter-lignes facilitent le déplacement et le gagnage des chevreuils , la réussite est confirmée si à 5 ans 70% des tiges sont viables .Les prélèvements sont de 10 chevreuils / 100ha. C'est à l'équilibre . Alors que nos attributions en forêt dans 75% des cas sont bien supérieures , et peut-être insuffisantes .

Donc sauf exception , NOS FORETS REGORGENT DE GIBIER , c'est un constat de déséquilibre généralisé nos forêts sont en « zone rouge » .

Les Techniques :

INDICATEURS FORESTIERS : IkaP Indicateur kilométrique pédestre (Comptage visuel sur un parcours identique) 3 fois le circuit 2 fois par an .

Enclôts – Exclôts environ 40 m² et comparatif . 6mX6m et 25 M grillage .

Diagnostic : Fiches d'inventaire statistique plant/plant après coupe rase .
(FDC et CRPF Côte D'Armor) .

INDICATEURS CHASSEURS : I.C.E. (indicateurs de changement écologiques)

Sur Chevrillard 6 mois max (3 ème pré-molaire Trilobée)

- . Poids évicéré à 20 gr près .
- . Longueur du maxillaire inférieur et la patte arrière du genou au bout du sabot .
- . Pour les chevrettes le nombre de corps jaunes ou ovules fécondées .
- . Suivi et analyse des tableaux de chasse .

IL Y A UNE CORELLATION ENTRE LA BONNE SANTE DES CHEVREUILS ET L' ETAT SATISFAISANT DE NOS FORETS .

Remedes applicables:

Pour réduire l'impact des dégats de chevreuils :

- . Chasser les chevreuils dès l' ouverture de la chasse (moins de pression hivernale sur les jeunes pousses .
- . Pas de consignes de tir sélectif .
- . Favoriser le recru herbacé et ligneux en favorisant l'entrée de lumière .
- . Augmenter la densité de plantation .
- . Protéger par répulsif , gainage ou engrillagement . Souhaitant un encouragement régional financier pour répondre aux objectifs du PRFB .
- . Travailler les dégagements en ne laissant que les têtes au soleil .

Les Outils souhaités :

- . Maintenir des tarifs de bracelet acceptable .
- . Permettre l' attribution de bracelets en cours de saison de chasse . Bourgeon terminal sectionné en hiver ,
- . Augmenter les attributions de P.C.
- . Encourager le plan de chasse triénel .
- . Permettre l'échange de bracelets sur territoires contigus ou mitoyens .

. Mettre en place un Bonus bracelet avant la plantation .

. Agir sur les populations de gibiers en zones non chassés .

CONCLUSIONS :

L' équilibre Agro-Sylvo-Cynégétique est une chimère , le déséquilibre est actuellement permanent , nous voulons une forêt diversifiée irrégulière et rentable , il est possible d' agir sur les dégâts de gibiers contrairement au réchauffement climatique et ses cohortes de conséquences sanitaires sur les arbres .

IL FAUT CHANGER DE MODELE POUR HARMONISER L' EQUILIBRE FORET6GIBIER .

Pour réguler Il faut assouplir et simplifier les P .C. conçu comme outil pour assurer le développement du grand gibier .

Il faut promouvoir et encourager les G.I.C (groupements d'intérêts cynégétiques) .

Il faut que les P.S.G. soient plus documenté et précis pour chiffrer les demandes P.C. successifs .

Il faut revoir l' administration de la chasse par une co-gestion Chasseurs- Agriculteurs- Forestiers car la recherche de densités importantes de grands gibiers sont antagonistes avec les intérêts de gestion durables agricoles et forestières .

On ne peut pas laisser aux seuls chasseurs la gouvernance de la chasse , je laisse à votre appréciation et à votre jugement l'analyse des résultats obtenus sur la biodiversité et tout particulièrement sur la réduction des populations de petits gibiers et sur la croissance non maitisée des grands ongulés de plaine .

Il nous reste à espérer rapidement des recensements précis de grands gibiers par des drones équipés de caméras à infra-rouge ou thermiques pour une chasse ADAPTATIVE durable et responsable .

Merci de votre aimable attention .